

L'Inde au Siam et au Laos et enfin les *Notothixos* paraissent localisés à Ceylan.

En résumé l'Extrême-Orient se montre particulièrement riche en Loranthacées.

---

R. BENOIST

DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES  
DE VOCHYSIACÉES

*Qualea tricolor* R. Benoist sp. nov.

Arbor procera, ramis griseis subteretibus, junioribus pubescentibus. Folia opposita, vel subopposita, petiolata; limbus ellipticus, basi acuta, apice acuminato, obtusiusculo, pagina utraque præter nervum principalem glabra. Nervi secundarii tenues, plurimi, paralleli, satis crebre anastomosibus conjuncti; marginalis margini proximus. Inflorescentiæ terminales minute albo-puberulæ. Flores solitarii vel bini, longiuscule pedicellati. Calycis segmenta externe albo-puberula: majus rotundatum, apice integro, calcare subcylindrico elongato; minora ovata. Corolla alba, basi lutea, duabus maculis rubris notata. Stamen glabrum, anthera quam filamentum longior. Ovarium pilosum. Fructus ignotus.

Feuille : pétiole long de 5 mm., limbe atteignant 50 mm. de long sur 25 mm. de large. Pédicelle long de 6 mm. Grand sépale long de 16 mm., large de 12 mm. Eperon long de 7 à 8 mm. Pétale long de 36 mm., large de 40 mm.

GUYANE FRANÇAISE. — Il existait déjà dans l'herbier du Muséum de Paris, des échantillons de cet arbre recueillis par Mélinon en 1842, sous le n° 142, sans indication de localité.

Je l'ai récolté (n° 1564) à Gourdonville, sur la rivière de Kourou, dans les bois qui séparent le camp de la transportation de la Savane Matiti. Il commençait à fleurir le 25 août.

Cette espèce se rapproche du *Q. rosea* Aubl., mais elle en diffère par ses feuilles plus petites, aiguës à la base, et à nervation beaucoup plus fine, le grand sépale entier au sommet, et à éperon cylindrique et allongé, la pubescence blanchâtre de toutes les parties de l'inflorescence.

**Qualea elegans** Taub. (*Mém. Soc. bot. Fr.*, 3, p. 30) nomen.

Frutex ramis quadrangularibus glabris. Folia opposita vel subopposita, breviter petiolata; limbus ovatus vel ellipticus, basi rotundata vel subcordiformi, apice obtuso, facie superiore glabra, inferiore pilosiuscula; nervis: principali crasso; secundariis plurimis, parallelis, prominentibus, anastomosibus crebris conjunctis. Inflorescentia terminalis, floribus solitariis vel binis. Segmenta calycis: majus ellipticum, apice integro, calcare brevi, sacciformi; minora rotundata; omnia externe pilosiuscula. Corolla albo-lutescens. Stamen glabrum, anthera quam filamentum longior. Ovarium et styli basis villosa.

Pétiole de la feuille long de 2-3 mm.; limbe atteignant 8 cm. de long et 5 cm. de large. Pédicelle long d'environ 13 mm. Grand sépale mesurant 22 mm. de long sur 18 mm. de large.

BRÉSIL; prov. Minas: Biribiry près de Diamantina, n° 19153 [*Glaziou*].

Cette espèce a les nervures secondaires nombreuses, mais plus écartées que chez les autres espèces de la même série; les anastomoses forment vers la marge une réticulation nette.

---

## R. BENOIST

### DESCRIPTIONS DE LÉCYTHIDACÉES NOUVELLES DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

#### **Lecythis congestiflora** R. Benoist nov. sp.

Arbor ramis crassis griseis, cortice rimoso. Folia alterna glabra, petiolo valido, supra canaliculato; limbo coriaceo, ovato vel lanceolato, ad basim rotundato vel obtuso, ad apicem obtuso, brevissime acuminato, margine integro, subtus revoluta. Nervi venæque supra fere immersi, subtus prominentes. Inflorescentiæ subterminales, glabræ, rachi simplici, valido. Flores magni, conferti, bractea ovata et duabus bracteolis ovatis muniti, subsessiles, ad basim articulati. Sepala parum inæqualia, glabra, longitudinaliter 5-7-nervosa, ovato-elliptica, apice rotundato, margine sparse ciliolato. Petala sex albo-rosea. Androphorum more generis. Stamina filamentum longiusculo, loriformi. Ovarium quadriloculare, glabrum, supra radiatum striatum. Stylus filiformis. Pyxidium ignotum.

Pétiole de la feuille long de 18-22 mm.; limbe long de 20-28 cm.; large de 9-14 cm. Inflorescence longue de 10 cm. au commencement de la floraison. Sépales longs de 15-17 mm.; larges de 12-15 mm. Pétales longs de 3 cm. environ. Style long de 7 mm.